



HERBARIO «SANDOZ»



WELLCOME  
LIBRARY

General Collections

P

4100



22502831102

[ca. 1950]



*Atropa Belladonna L.*

Los alcaloides totales de la hoja de la belladona, contenidos en la **Bellafolina**, el **Belladenal** y el **Bellergal**, son extraídos de la **Atropa Belladonna L.** (**solanácea**). Origen: **Europa, Africa del Norte, Asia occidental.**





*Uragoga Ipecacuanha*

Los alcaloides puros de la ipeca contenidos en el **Ipecopan** y en la **Ipesandrina**, son extraídos de la ipecacuana, **Uragoga Ipecacuanha** (Stokes) Baillon, rubiácea, originaria del Brasil.





*Secale cornutum*

La Basergina, el Gynergeno, el Neo-Gynergeno y el Bellergal contienen los alcaloides puros del **Secale cornutum**, forma invernal del **Claviceps purpurea Tulasne (hipocráceas)**. Parásito de los cereales y particularmente del centeno.





*Strophanthus Kombé*

El **Estrofosid** contiene el glucósido inicial principal del **Strophanthus Kombé Oliver**, planta africana de la familia de los **apocináceas**.





*Allium sativum*

La **Allisatina**, a base de ajo inodoro obtenido por fijación sobre un carbón activado, posee toda la acción de la planta fresca, el **Allium sativum** (liliácea), originaria del Turquestan chino.





*Digitalis lanata*

Los glucósidos genuinos cristalizados, los lanatósidos A, B y C, los tres juntos contenidos en el **Digilanid** y el lanatósidio C, único componente del **Cedilanid**, forman el complejo glucosídico inicial de la **Digitalis Lanata Ehrhart** (escrofulariácea). Se la encuentra en el **sud-este de**

**Europa** (Hungría, Yugoslavia, Balcanes).





*Ephedra distachya* L.

La efedrina, uno de los componentes de la **Ipesandrina**, es un alcaloide extraído de diversas variedades de la **Ephedra**, familia de **Gnetáceas**. Su recolección se hace sobretodo en el **sud-oeste de Europa y en Asia**.





*Lobelia inflata*

La lobelina de la **Lobelina „Sandoz“** es el clorhidrato del principal alcaloide de la **Lobelia inflata L. (lobeliácea)** que crece en el **nord-este de America.**





*Cassia angustifolia* (*Folium Sennæ*)

Los glucósidos iniciales cristalizados de la hoja del sen que compone el **Pursenid**, provienen de la **Cassia angustifolia**, leguminosa (papilionácea), cultivada en las **Indias**.





*Raphanus sativus niger*

El **Rafabil** contiene el total de los principios activos del rábano negro, **Raphanus sativus L., var. niger (Miller) Pers.**, fijados sobre un carbón activado y por lo tanto exentos de olor. Es una planta cultivada perteneciente a la familia de las **crucíferas**.





*Urginea maritima* (L.) Baker  
(*Scilla maritima* L.)

La **Escilarina** contiene los glucósidos iniciales de la escila marítima **Urginea maritima** (L.) Baker (*Scilla maritima* L., Urg. Scilla Steinh.), liliácea, de los países mediterráneos y de las Islas Canarias.





